

MetaCell® TransAAV 02

化学成分确定培养基

产品简介

MetaCell® TransAAV 02是为满足多种HEK293细胞系针对AAV病毒血清型包装而设计的培养基。该培养基不含水解物、蛋白质和任何动物源成分，可支持各种HEK293细胞特别是VPC2.0细胞和293F细胞的高密度生长与瞬时转染。培养基成分经过高度优化，兼容商业化阳离子转染试剂。

MetaCell® TransAAV 02适用于科研和基于细胞培养的大规模生物制品的生产，但不可直接用于人体或作为药物用。

MetaCell® TransAAV 02已含有4mM谷氨酰胺衍生物。

产品名称	形态	产品编码	包装规格	储存条件	有效期	推荐使用范围
MetaCell® TransAAV 02	液体	L2007-0500	500mL	2-8℃， 密闭、避光	12个月 (暂定)	针对AAV病毒血清型包 装的多种HEK293细胞系
		L2007-1000	1000mL			

培养条件

培 养 基：MetaCell® TransAAV 02

培 养 类 型：悬 浮

细 胞 系：Expi293F™，FreeStyle™ 293-F，VPC2.0

培养参数设置：

摇瓶体积	125mL	250mL	500mL	1L	5L	3L
培养体积（mL）	30-35	60-70	120-140	240-280	600-1000	1500-2000
摇床转速	125±5 rpm（振幅19mm） 120±5 rpm（振幅25mm） 95±5 rpm（振幅50mm）				105±5 rpm 95±5 rpm 80±5 rpm	
摇瓶类型	PETG或者PC材质，透气，无挡板					
培养环境	37±0.5℃，8% CO ₂ ，湿度≥80%，确保适当的气体交换并尽量避光培养					

细胞复苏

1. 干冰运输的细胞应立即复苏或放置在液氮环境下3-7天后再进行细胞复苏。
2. 提前取39mL MetaCell® TransAAV 02 于125mL摇瓶中37 °C预热。
3. 从液氮罐中取出一支冻存细胞，置37 °C水浴锅中，水浴1-2分钟，注意观察冻存管里细胞冰块状态。
4. 15mL离心管里添加9mL预热的MetaCell® TransAAV 02 培养基，将复融后的细胞转移至其中混匀。
5. 1000rpm离心4分钟后，弃上清，使用已预热的MetaCell® TransAAV 02 培养基重悬细胞，然后全部转移至125mL摇瓶中，确定最终培养体积为30mL，混匀后取样测定细胞的密度和活率，细胞密度应该在0.3-0.4×10⁶ cells/mL。

注：通常细胞的活率会在解冻后24h内略有下降，培养3-4天后，会逐渐恢复到90%以上。

6. 建议的摇床培养参数37 °C, 8% CO₂, 95±5 rpm (振幅50mm)。

7. 培养3-4天后, 当细胞密度≥3.0×10⁶ cells/mL, 且活率≥90%时传代。

注: 若细胞复苏2-3代后, 细胞生长状态正常, 活率≥95%, 应尽快安排冻存。

细胞传代

1. 提前将MetaCell[®] TransAAV 02 放入37 °C条件下预热20-30分钟。

2. 当细胞密度达到3.0-4.0×10⁶ cells/mL且细胞活率≥95% (2-4天) 时, 即可进行传代培养。

注: 不同类型的HEK293细胞可能具有不同的对数生长期范围, 需根据实际情况确定传代时间, 以保持细胞传代培养时处于对数生长期的早期。

3. 推荐的细胞接种密度0.4-0.6×10⁶ cells/mL。

4. 无菌转移所需的种子细胞液至摇瓶中, 并添加适量已预热的MetaCell[®] TransAAV 02 培养基, 参考培养条件设置摇床参数, 每2-4天用新鲜培养基按上述步骤进行传代培养。

5. 细胞解冻复苏后传代三次以上, 待细胞生长状态稳定后方可进行后续转染或冻存等实验。

细胞冻存

1. 准备好足量的处于对数生长早期且细胞活率≥95%的细胞作为冻存用细胞。

2. 最终的细胞冻存密度控制在10.0-15.0×10⁶ cells/mL。

3. 提前配制冻存液 (90% MetaCell[®] TransAAV 02 +10% DMSO), 2-8 °C预冷30分钟备用。

4. 取适量细胞悬液, 1000rpm离心4分钟, 弃上清, 用2-8 °C预冷的冻存液重悬后, 按照冻存规格, 立即将细胞悬液分装至冻存管中。

5. 通过程序降温或人工控制等方式将细胞逐步降温至-80°C冷冻状态 (降温速率为1°C/分钟)。

6. 24小时后将完成冷冻的细胞转移至液氮储罐 (气相) 中储藏 (储存温度范围: -200°C至-125°C)。

细胞驯化

大多数情况下, 无血清培养的HEK293细胞可以直接适应MetaCell[®] TransAAV 02, 如果直接更换培养基 (直接驯化) 失败, 则推荐采用梯度替换 (间接驯化) 的方法使HEK293细胞适应MetaCell[®] TransAAV 02。

注: 用于驯化的HEK293细胞需要处于对数生长期的早期, 且活率≥95%。

● 直接驯化法

1. 对于可以直接驯化的细胞, 当细胞活率≥95%且处于对数生长早期时, 可尝试直接从无血清培养基接种到MetaCell[®] TransAAV 02 中。

2. 以 0.4-0.6×10⁶ cells/mL 的接种密度将 HEK293 细胞接种至新鲜的 MetaCell[®] TransAAV 02 中 (参看细胞传代步骤)。

3. 培养3-4天后, 检测细胞密度以及活率, 此时细胞活率应≥95%, 如果活率较低, 则需要采用间接驯化法。

4. 继续传代3-4次, 当细胞密度在接种的3-4天内达到3.0-4.0×10⁶ cells/mL, 且细胞活率≥95%时, 可认为驯化完成, 后续可进行正常的细胞传代、转染和冻存。

● 间接驯化法

1. 用原培养基调整待驯化细胞的密度至0.5-0.8×10⁶ cells/mL, 加入25%体积的MetaCell[®] TransAAV 02, 使得最终细胞密度为0.4-0.6×10⁶ cells/mL。

2. 培养3-4天后传代，传代的起始密度仍为 $0.4-0.6 \times 10^6$ cells/mL，

(1) 如细胞生长状态良好，且活率 $\geq 90\%$ ，则传代时调整原培养基与MetaCell[®] TransAAV 02的比例为50:50；

(2) 如细胞生长缓慢，可对细胞进行离心换液，离心条件为1000rpm，4分钟。此时的混合培养基依旧为原培养基和MetaCell[®] TransAAV 02 以75:25比例混合。
3. 重复步骤2并逐渐增加MetaCell[®] TransAAV 02 所占的比例（推荐比例 50:50，25:75），直到使用100%的MetaCell[®] TransAAV 02 进行细胞培养。
4. 在100%的MetaCell[®] TransAAV 02 中继续培养3-5代，当细胞密度在接种的3-4天内达到 $3.0-4.0 \times 10^6$ cells/mL且细胞活率 $\geq 95\%$ 时，可视为驯化完成。驯化完成后至少传代三次，待细胞生长状态稳定后方可进行后续转染或冻存等实验。

细胞转染

具体操作请参考思鹏生物MetaCell[®] TransAAV Panel 瞬时转染操作指南。

相关产品订购信息：

产品	类别	形态	目录号	包装规格
MetaCell [®] TransAAV 02	培养基	干粉	P2007-X010	10L
			P2007-X100	100L
		液体	L2007-0500	500mL
			L2007-1000	1000mL
MetaCell [®] TransAAV 01	培养基	干粉	P2010-X010	10L
			P2010-X100	100L
		液体	L2010-0500	500mL
			L2010-1000	1000mL
MetaCell [®] TransAAV 03	培养基	干粉	P2008-X010	10L
			P2008-X100	100L
		液体	L2008-0500	500mL
			L2008-1000	1000mL
MetaCell [®] TransAAV Titer Enhancer	添加剂	液体	L2013-0010	10mL
			L2013-0100	100mL
			L2013-1000	1000mL
MetaCell [®] TransAAV Feed	补料	液体	L2012-0100	100mL
			L2012-1000	1000mL
MetaCell [®] TransAAV Panel	试剂盒	/	L2011	kit